

定期予防接種について

種類の異なるワクチンの受け方

【生ワクチン】→【生ワクチン】接種後
27日以上あける

お誕生日
年 月 日

※ 予防接種の分類は、2024年2月末現在のものです。

下呂市版

1 予防接種の種類		2 どんな病気？	3 ワクチンの効果は？	ワクチン の種類	4 回数	受け方 計画は、かかりつけ医と 相談しましょう。	1 か 月	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	
						効果的な接種時期と間隔	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
定期 予防 接種	ロタウイルス	ロタウイルスによる感染症は、5歳までにほとんどの人が感染を受ける。激しい下痢などで、脱水、けいれん、脳症をおこすこともある。2歳未満だと重症化しやすい。生後6か月頃から患者が急増する。	1価か5価、どちらか1種類を選ぶ。	生 (経口)	1 価 2 回	1 回目は、生後2 か月（6 週）～生後1 4 週6 日までに接種。 2 回目は4週以上の間隔を空ける。 24週までに完了		1	2	1 回目（ 年 月 日） 2 回目（ 年 月 日）		4 週以上		★24週までに完了する											
					5 価 3 回	1 回目は、生後2 か月（6 週）～生後1 4 週6 日まで 2、3 回はそれぞれ4 週以上の間隔を空ける。 32週までに完了		1	2	3	★32週までに完了する		4 週以		4 週以上		1 回目（ 年 月 日） 2 回目（ 年 月 日） 3 回目（ 年 月 日）								
	小児用肺炎球菌	肺炎球菌は、子どもの多くが鼻の奥に持っている。ときに中耳炎や重い髄膜炎などを起こす。肺炎球菌が原因の化膿性髄膜炎は、5歳未満では、10万人に約2.5～3人、年間で150人前後が発症しているとされている。死亡率や後遺症は、ヒブ感染症による髄膜炎より高く、約2 1 %が予後不良。	予防接種開始後、多くの国から、細菌性髄膜炎が激減したという報告がある。	不 活 化	4 回	接種期間：生後2 か月～5歳の誕生日前日まで 接種開始が生後2 か月～7 か月に至るまでの場合 27日以上あけて生後24か月に至るまで（標準的には、生後12か月に至るまで）に3回接種。3回目終了後、60日以上（標準的には1歳～1歳3か月）あけて1回追加。 ■初回2回目が生後12か月を超えた場合は、3回目の接種は行わない。追加接種はできる。		1	2	3	27日以上 27日以上		6 0 日以上		1 歳以降で実施 （標準は、1歳～1歳3か月接種）		追加（ 年 月 日）								
					3 回	接種開始が生後7 か月～1 2 か月に至るまでの場合 27日以上あけて生後2 4 か月に至るまで（標準的には、生後12か月に至るまで）に2 回接種。生後24か月を超えた場合は接種は行わない。追加接種はできる。					1	2	27日以上		6 0 日以上		1 歳以降で実施		追加（ 年 月 日）						
					2 回	接種開始が1歳～2 歳誕生日に至るまでの場合 60日以上あけて、2回接種。												1	2	1 回目（ 年 月 日） 2 回目（ 年 月 日）					
					1 回	接種開始が2 歳～5歳の誕生日に至るまでの場合 1回接種。														1	（ 年 月 ）				
	B型肝炎	B型肝炎ウイルスの感染者は約1 0 0 万人(100人に1人)とされている。B型肝炎に感染し、慢性肝炎になると長期にわたる治療を要し、最悪の場合肝硬変や肝臓がんなどの命にかかわる病気を引き起こす。	接種者の70～9 0 %は抗体を獲得し、効果は数年～10年持続する。		不 活 化	3 回	接種期間：生後1 2 か月に至るまで 生後2 か月から開始 27日間隔で2 回目、1 回目の接種から139日後に3 回目を接種する		1	2	139日以上（約5か月）		3		27日以上		3 回目（ 年 月 日）								
	5種混合	ジフテリア菌がのどに炎症を起こす病気。重症になると呼吸困難などをおこし死亡することもある。 百日咳は、特有のけいれん性の咳発作を特徴とする急性気道感染症である。母親からの免疫が期待できないため、乳児期早期からかかり、とくに生後6か月以下では死に至る危険性も高い。 急性灰白髄炎（ポリオ）は、ポリオウイルスにより、胃腸炎などを起こす。1 0 0 0 人～2 0 0 0 人に1 人麻痺を起こし、後遺症が一部残る場合がある。 破傷風菌は、土の中にいて、傷などから体内に入る。神経を傷め、痙攣をおこす。後遺症や死亡することもある。 インフルエンザ菌b 型という細菌による病気で、インフルエンザウイルスとは全く別もの。ヒブ感染症は、中耳炎や気管支炎、髄膜炎のような重い病気をおこす。	ジフテリアは、予防接種がはじまり、患者発生は年間0～1 人。予防接種により患者激減。追加接種をすることで1 0 年間抗体持続。 予防接種を受けた人が受けない人より9 0 %発症を防げた。一定の抗体獲得あり。 予防接種の効果で日本での発症報告なし。生ワクチンから不活化になったが、麻痺性ポリオは90%予防有効。初回から10～1 5 年免疫保持。 追加接種後1 0 年持続、11～12歳頃、追加接種が必要。 欧米では、予防接種開始後、重症感染症は劇的に減少。 ヒブの抵抗力は、3 歳以上で急速に上昇する。	不 活 化	I 期 4 回	接種期間： I 期：生後2か月～7歳6か月に至るまで 初回1回目から3回目までを20日以上の間隔をあけて生後12か月までに接種。6か月以上（初回終了後12～18か月未満が標準）あけて1回追加接種。		1	2	3	20日以上 20日以上		(初回終了後、1 2 ～18か月未満)		4		追加（ 年 月 日）								
	ジフテリア 百日咳 急性灰白髄炎 (ポリオ) 破傷風 Hib	II 期：11歳以上13歳未満 (標準的な期間は11歳に達した時期から12歳に至るまで) 二種混合（ジフテリアと破傷風）を追加接種						1 回目（ 年 月 日） 2 回目（ 年 月 日） 3 回目（ 年 月 日）	追加（ 年 月 日）																
	BCG	結核の予防接種。結核菌による空気感染で、肺から入り、肺結核などを起こす。予防接種を受けていない乳児が感染すると、病気の発症がはやく、結核性の髄膜炎など重症になりやすい。	感染を受けても、予防接種を受けていない人の1 / 4 に発病を抑える。重症化の予防には極めて効果的。効果は10～15年。		生	1 回	接種期間：生後12か月に至るまで 生後5か月に達した時～8か月に達するまでの期間が望ましい						1	(年 月 日)											
	麻しん風しん (MR)	麻しんは、麻しんウイルスによる感染。免疫力を落とすので、症状が重く、他の感染症にもかかりやすくなる。 風しんは、風しんウイルスによる感染。問題なく治ることが多いが、まれに脳症などが起こる。	接種者の9 5 %は抗体獲得し、長期に持続する。 接種者の9 5 %は抗体獲得し、20年近く持続する。	生	2 回	接種期間： I 期：生後12か月～生後24か月に至るまで 1歳の誕生日を迎えたら早めの接種が望ましい II 期：保育園年長時（就学前年度）に接種												1	1 期（ 年 月 ）		2 期（ 年 月 ）				
	水痘	水痘帯状疱疹ウイルスによっておこる感染力が大変強い病気。発疹と発熱が症状。3 8 度を超える熱が2～3日続き、体に虫さされのような赤い斑点が出てくる。1 日くらいで水ぶくれになり、全身に広がる。強いかゆみもある。多くの場合それほど重くならないが重症化することもある。0 歳と1 5 歳以上が重症化しやすい。	1 回の接種で8 0 ～9 0 %は抗体を獲得する。1 回の接種により重症の水痘をほぼ100%予防でき、2 回の接種により軽症の水痘も含めてその発症を予防できると考えられています。	生	2 回	接種時期：生後12か月から生後36か月に至るまで 1 回目の接種は生後12か月～15か月に至るまで。2 回目は、1 回目終了後3か月以上（標準は、6か月～12か月まで）あけて接種。												1	2	1 回目（ 年 月 日） 2 回目（ 年 月 日）					
	日本脳炎	日本脳炎ウイルスに感染すると、うち100人～1 000 人に1 人が脳炎を発症します。脳炎になると、死亡率は20～40%、後遺症を残す場合も多い。最近は年間10人以下の発症。	接種後80%は発症を阻止すると推定。初回2回と追加1 回接種で基礎免疫を獲得しておくことが大切。その後も5～10年毎の追加接種が望ましい。	不 活 化	I 期 3 回 II 期 1 回	接種時期： I 期：生後6か月～7歳半に至る前日まで 初回は、標準は3 歳に達したときから4 歳に達するまでに、6 日（標準的には6 日～28 日）以上あけて2 回接種。 追加は、初回接種終了後6か月（標準的には概ね1 年）以上あけて1 回 II 期：9 歳～13歳未満の間に1 回	日本脳炎流行地域に渡航・滞在する 小児は6か月より接種可能です。 接種希望の方は保健センターに相談ください												1	2	3	6 日以上 （標準は6 日～28 日）		6 か月以上 （標準は1 年以上）	
																			1 期1 回目（ 年 月 日） 1 期2 回目（ 年 月 日）			1 期追加（ 年 月 日）			